

Vaccinazioni per l'infanzia

Calendario in vigore dal 1 gennaio 2017 e valido fino all'adozione del calendario unico regionale

Vaccino	Nascita	3° mese	3° mese	4° mese	5-6° mese	6° mese	11° mese	13° mese	13-14° mese	5-6 anni
DTPa		DTPa			DTPa		DTPa			DTPa
IPV		IPV			IPV		IPV			IPV
Epatite B *	HBV *	HBV			HBV		HBV			
Hib		Hib			Hib		Hib			
MPRV - MPR									MPRVar oppure MPR+Var	MPRVar oppure MPR + Var
PCV *		PCV			PCV		PCV			
Men C									Men C	
Men B			Men B	Men B		Men B		Men B		
Varicella									Var	Var

Legenda:

DTPa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare

IPV: vaccino antipolio inattivato

HBV: vaccino antiepatite B

Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia

MPRVar: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella

PCV: vaccino antipneumococcico coniugato

Men C: vaccino antimeningococcico C coniugato

Men ACWY: vaccino antimeningococcico quadrivalente coniugato ACWY

Men B: vaccino antimeningococcico B

Var: vaccino antivariella

HBV* Ai bambini nati da madri positive per HBsAg, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche antiepatite B; il ciclo va completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il tredicesimo mese di vita, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni. (vedi capitolo dedicato per le specifiche)

Interpretazione delle indicazioni di offerta per età:

3° mese: dal 61° giorno di vita

4° mese: dal 91° giorno di vita

6° mese: dal 151° giorno di vita

13 ° mese: dai dodici mesi compiuti (12 mesi+1 giorno)

5-6 anni: dai 5 anni compiuti ai 7 non compiuti